

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΡΙΝΗ

Η ευαισθησία στην ασπιρίνη (acetylo-salicylic acid = ακετυλοσαλικυλικό οξύ ) είναι αρκετά συχνή. Καμιά φορά εμφανίζεται σε άτομα με άσθμα και/ή ρινικούς πολύποδες, οπότε είναι δυνατόν να προκαλέσει βρογχόσπασμο και/ή ρινίτιδα. Άλλη μια από τις συνήθεις εκδηλώσεις της μπορεί να είναι η κνίδωση/αγγειοοίδημα, σε άτομα με ή χωρίς υποκείμενη νόσο. Γι'αυτό το λόγο πρέπει να **ελέγχετε προσεκτικά το περιεχόμενο κάθε φαρμάκου** πριν το χρησιμοποιήσετε.

Τα φάρμακα που μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιούν οι ασθενείς με υπερευαισθησία στην ασπιρίνη για **πυρετό ή πόνο** είναι τα ακόλουθα:

- Παρακεταμόλη/ακεταμινοφαίνη (σε δόσεις<1000mg): Depon, Panadol, Apotel, Dolal, Lonarid, Lonarid-N, Anadin, Dalminette, Tulnezin
- Νιμεσουλίδη: Mesulid, Nimesulide, Amocetine, Alencast, Volonten, Min-A-Pon κ.ά.
- Κοξίμπες: Celebrex, Arcoxia, Dynastat\*
- Δεξτροπροποξυφαίνη υδροχλωρική: Romidon, Zideron

*\*Να σημειωθεί ότι τα σκευάσματα που ανήκουν στις κοξίμπες γίνονται καλά ανεκτά από όλους τους υπερευαίσθητους ασθενείς.*

### ΑΠΟΦΥΓΗ

Τα περισσότερα **αναλγητικά, αντιπυρετικά, αντιρευματικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα** περιέχουν **ασπιρίνη ή συγγενείς ουσίες, που πρέπει να αποφεύγονται**. Παραδείγματα φαρμάκων που περιέχουν ασπιρίνη είναι τα παρακάτω:

- Acetylsalicylic acid (Aspirin, Salospir, Algon, Upsalgin-N), Acetylsalicylate lysine (Egicalm), Diflunizale (Analeric, Di-Flu)

Αντιρευματικά φάρμακα (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη/αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης) που παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντίδραση στην πλειονότητα των ατόμων με ευαισθησία στην ασπιρίνη (σε ποσοστό 60 – 100%) και **πρέπει επίσης να αποφεύγονται** είναι τα εξής (ενδεικτική αναφορά – δεν αναφέρονται όλα τα σκευάσματα που κυκλοφορούν) :

- Ιβουπροφαίνη (Brufen, Algotren, Pinafor, Rozovin)
- Ινδομεθακίνη (Forthathrin, Indocid, Reumacid, Itapredin, Intibutaz)
- Ναπροξένη (Naprosyn, Nycopren, Anaprox)
- Φαινοπροφαίνη (Expron)
- Ετοδολάκη (Lonine, Ecradoxan)
- Δικλοφαινάκη (Voltaren, Cataflam, Delimon, Evinopon, Reumavek, Ruvominox, Javipren, Urigon, Vurdon)
- Κετοπροφαίνη (Oruvail, Farboril)
- Πιροξικάμη (Feldene, Brexin, Valopon, Zerospasm, Zitumex, Flodeneu, Neo -Axedil, Oximezin, Pedifan, Proponol, Pycost, Ruvamed, Sinartrol)
- Μεφαιναμικό οξύ (Ponstan, Aidol, Demostan, Vidan)
- Ναβουμετόνη (Relifex, Mevedal, Anfer)
- Ασεκλοφαινάκη (Biofenac, Sovepan)
- Φλουβιρπροφαίνη (Betice, Bonatol-R, Flurofen, Pizar)
- Τολφαιναμικό οξύ (Gantil, Clotam, Polmonin, Purfalox, Turbaund)
- Θειαπροφαινικό οξύ (Surgam)
- Νιφλουμικό οξύ (Niflamol)
- Τενοξικάμη (Tilcitin, Toscacalm, Algin-Vek, Amcinafal, Artroxicam- Medichrom, Indo-Bros, neo-Endusix, Oxytel, Soral, Palitenox, Liaderyl)
- Μελοξικάμη (Movatec, Loxitan)

Για οποιοδήποτε σκεύασμα ή φαρμακευτική ουσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό πρέπει **υποχρεωτικά να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ενημερώνοντάς τον για το πρόβλημά σας και επιδεικνύοντας το παρόν έντυπο.**